Řešení cvičení 1

1. File > Open > vltava.wct
2. Head > Store Values to Short Headers > Header data, vyber Syntaxon code
    1. nejdříve je třeba snímky seřadit podle krátkých hlaviček: Sorting > Sort Short Headers, volba All, Alphabetically a In ascending order
    2. na hlavní liště změňte barvu pro snímky na červenou
    3. vyberte první snímek s hlavičkou 32AC01 a do jeho krátké hlavičky klikněte pravým tlačítkem myši, podržte klávesu SHIFT a pravým tlačítkem myši klikněte na poslední snímek
    4. abyste přesunuli snímky na začátek tabulky, je potřeba přesunout bílé snímky doprava: změňte barvu snímků na bílou a klikněte na bílou šipku doprava
4. podobně jako v předchozím bodě vyberete modře snímky s hlavičkou 32BA03 a přesunete je na začátek (odsunete bílé snímky doprava)
5. to lze udělat buď manuálně - separátor se do tabulky vpraví tak, že podržíte klávesu SHIFT a kliknete na krátkou hlavičku posledního snímku ve skupině levým tlačítkem myši (pokud jsou skupiny barevně odděleny jako tady, můžete také použít menu Separators > Make Separators > Within Colors)
6. Species > Species Data > Layer View > Number (uloží informaci o číslu patra do sloupečku s druhovými daty), a pak Sort > Sort Species By Species Data (Layer, EIV etc.) a vyberte možnosti All, Numerically a In ascending order
7. Species > Species Data > Frequency > All Table
    1. nejdříve je nutné obarvit druhy v bylinném patře nějakou barvou (např. červeně): změňte barvu pro Species na červenou, najděte první druh bylinného patra v tabulce (bylinné patro má číslo 6), a na název druhu klikněte pravým tlačítkem myši, pak najděte poslední druh bylinného patra v tabulce, stiskněte SHIFT a pravým tlačítkem myši na druh klikněte
    2. nyní setřiďte červené druhy podle frekvence, která je uložená v kolonce Species data: Sorting > Sort Species By Species Data (Layer, EIV etc.) a vyberte možnosti Red, Numerical a In descending order (pokud není v nabídce Red ale jiná barva, změňte barvu pro Species na hlavní liště)
    3. změňte barvu Species na modrou a v tabulce označte všechny druhy bylinného patra, které mají frekvenci vyšší nebo rovnu 20 (od druhu *Drypoteris filix-max* po *Hieracium sabaudum*)
    4. do krátkých hlaviček uložte počet modrých druhů: Head > Store Values To Short Headers > Number of BLUE species
9. Sort > Sort Short Headers, a vyberte volby Red > Numerically > In ascending order